

PURETHAL[®] Αλλεργοειδές Ολοετή, προεποχιακή ανοσοθεραπεία


One^{vial}
only.



Ένα φιαλίδιο • Μία συγκέντρωση

Αρχική θεραπεία

Θεραπεία συντήρησης: 4±2 εβδομάδες



Διαθέσιμα αλλεργιογόνα:

Γύρεις:

- Grasses
- Birch
- Trees (Birch, Alder, Hazel)
- Grasses + Birch
- Grasses + Trees
- Grasses + Triticum
- Artemisia
- Grasses + Artemisia
- Parietaria

Ακάρια:

- D. pteronyssinus
- D. pteronyssinus + D. farinae



εβδομάδες

hal
allergy
therapeutic vaccines

INSPIRED BY PERFECTION

PURETHAL® Αλλεργοειδές Ολοετή, προεποχιακή ανοσοθεραπεία

Μείωση δόσης σε περίπτωση υπέρβασης του συνιστώμενου
μεσοδιαστήματος μεταξύ ενέσεων:

Αρχική θεραπεία με εβδομαδιαία μεσοδιαστήματα

Από τελευταία ένεση	Μείωση δόσης
3 εβδομάδες	επανάληψη τελευταίας
4 εβδομάδες	κατά 0.1 ml
5 εβδομάδες	κατά 0.3 ml
Πάνω από 5 εβδομάδες	επανάραξη

Θεραπεία συντήρησης με μεσοδιαστήματα 4-εβδομάδων

Από τελευταία ένεση	Μείωση δόσης
8 εβδομάδες	κατά 0.1 ml
9 εβδομάδες	κατά 0.2 ml
10 εβδομάδες	κατά 0.3 ml
Πάνω από 10 εβδομάδες	επανάραξη

One vial
only.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
Συμπληρώστε την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρατε:

- **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα **Νέα φάρμακα** N
- τις **ΣΟΒΑΡΕΣ** ανεπιθύμητες ενέργειες για τα **Γνωστά φάρμακα**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κατεχάκη 22, 115 25 Αθήνα, Τ 210 6728 318-9, F 210 6728 358, E info@alfamedica.gr

ALFAMEDICA

Σύνθεση: Το PURETHAL περιέχει 20,000 AUeq/ml τροποποιημένων αλλεργιογόνων εκχυλισμάτων, προσροφημένων σε υδροξείδιο του αλουμινίου. Ενωτήριο για υποδόρια ένεση.

Ενδείξεις: Το PURETHAL ενδείκνυται για την θεραπεία των αλλεργικών διαταραχών άμεσου τύπου, όπως είναι η αλλεργική ρινίτιδα, η αλλεργική επιπεφυκίτιδα και το αλλεργικό βρογχικό άσθμα. **Δοσολογία και χορήγηση:** Η θεραπεία ξεκινά με υποδόρια ένεση 0,05ml. Μετά την πρώτη ένεση η δόση αυξάνεται σταδιακά με εβδομαδιαία μεσοδιαστήματα μέχρι τη μέγιστη δόση **0,5 ml**. Αν ο ασθενής ανέχεται καλά τη θεραπεία, τότε μετά την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας, ο κύκλος μπορεί να διευρυνθεί, με μεσοδιαστήματα 4 εβδομάδων (± 2) μεταξύ των ενέσεων και τελικώς σε μηνιαία μεσοδιαστήματα. Συνιστάται η διεξαγωγή της θεραπείας για περίοδο 3 - 5 διαδοχικών ετών. **Αντενδείξεις:** Οξείες φλεγμονώδεις παθήσεις / εμπύρετη λοίμωξη στο όργανο στόχος, μη αναστρέψιμες παθήσεις του οργάνου στόχος (εμφύσημα, βρογχεκτασίες κ.α.), αυτοάνοσες διαταραχές (π.χ. των νεφρών, θυρεοειδούς αδένα, νευρικού συστήματος και ρευματικές παθήσεις), ανοσοανεπάρκειες (π.χ. προκαλούμενες από ανοσοκατασταλτικά), σοβαρό μη-ελεγχόμενο άσθμα, ιδιαίτερα με FEV1 σταθερά κάτω από 70% των προβλεπόμενων τιμών, καρδιαγγειακή ανεπάρκεια με αυξημένο κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθεί αδρεναλίνη, κλινικά ενεργός κακοήθης όγκος, υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η θεραπεία με ενέσεις ανοσοθεραπείας πρέπει να διενεργείται από ειδικούς ιατρούς. Κατά τη διάρκεια και μετά από το πέρας της κάθε ένεσης πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη αντιμετώπιση αναφυλακτικού σοκ. Μετά από την ένεση, ο ασθενής πρέπει να παραμένει υπό ιατρική επίβλεψη για 30 λεπτά. Ειδική προφύλαξη πρέπει να ληφθεί σε περίπτωση θεραπείας με β -αναστολείς, κύηση και γαλουχία και σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί προφυλακτική ανοσοποίηση σε λιγότερο από 7 ημέρες μετά την τελευταία ένεση με PURETHAL. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Ειδικότερα στην περίπτωση ασθενών με υψηλό βαθμό ευαισθησίας, μπορεί να συμβούν έντονες αλλεργικές αντιδράσεις. Γενικά αυτές παρατηρούνται εντός 30 λεπτών μετά τη διενέργεια της ένεσης. Έντονες τοπικές αντιδράσεις στο σημείο ένεσης. Επανεμφάνιση των αλλεργικών συμπτωμάτων του ασθενούς ως ήπιες συστηματικές αντιδράσεις (κνησμός οφθαλμών, παρμός, βήχας, ατοπικό έκζεμα), έντονες συστηματικές αντιδράσεις (ταχύπνοια, γενικευμένη κνίδωση, αγγειοοίδημα) και σε πάρα πολύ σπάνιες περιπτώσεις αναφυλακτικό σοκ. Μετά την ένεση υποδόρια οξείδια και οίδημα(κοκκίωμα) μπορεί να παρατηρηθούν στο σημείο ένεσης. **Συσκευασία:** Το PURETHAL είναι συσκευασμένο σε φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων 3 ml, με ελαστικό πώμα και φλαντζωτό καπάκι αλουμινίου.

hal
allergy
therapeutic vaccines

INSPIRED BY PERFECTION